

VAKA ÖRNEKLERİ İLE ZOR ENTÜBASYON

Doç. Dr. Ali GÜR
Atatürk Üniversitesi
Acil Tıp AB

VAKA 1

- 25 Yaşında erkek hasta
- Yüzünde bazal hücreli karsinomu tanısı almış 10*15 cm lik kitlesi mevcut
- Solunum arresti olması üzerine 112 ekipleri tarafından ambulananarak acile getirildi.
- Hastaya entübasyon denenmiş ancak başarılı olunamamış.
- Hastanın vital bulguları:
 - Tansiyon:60/30 mmHg
 - Saturasyonu: %30
 - Nabız: 150/dk



Hava yolunu nasıl güvenlik altına alalım?

Zor Hava Yolu Nedenleri

- Oral/faringeal tümör, hematoma veya hemangiyoamlar
- Submandibuler, peritonsiller veya epiglot infeksiyonları
- Laringeal atrezi gibi konjenital anomaliler
- Yabancı cisimler
- Yüz ve boyun travmaları
- İnhalasyon yanığı
- Obezite
- Yetersiz boyun ekstansiyonu
- Çene, dil, boyun ve diş anomalileri

LEMON

- **L**ook externally (Obezite, kesici dişler, kısa boyun, travma)
- **E**valuate 3-3-2
- **M**allampati
- **O**bstruction?
- **N**eck mobility (Servikal trama, AS, Romatoid Artrit)




Ağız açıklığı



Hyomental



Tirohyoid



Mallapati





ZOR HAVA YOLU ÖNGÖRÜSÜNDE BULUNULAN ÖZELLİKLER

- Üst kesici dişler uzun
- Çene kapatılınca maksiller kesici dişler mandibuler kesicilerin belirgin olarak önünde
- Hasta istemli olarak mandibuler kesici dişleri maksiller kesicilerin önüne çıkartamıyor
- Kesici dişler arası mesafe 3 cm'den az
- Hasta oturur pozisyonda dil dışarıda iken uvula görülmüyor (Mallampati>II)
- Damak çok kavisli veya çok dar
- Mandibula boşluğu endüre, kitle ile dolu
- Tiomental mesafe 3 parmakdan kısa
- Boyun kalın ve kısa
- Çene ucu göğse değmiyor, boyun ekstansiyonu kısıtlı

Cormack & Lehane Laringoskopik Görünüm

- **Evre I:** Glottik açıklık tam olarak görülebilir.
- **Evre II:** Anterior açıklık görülemez.
- **Evre III:** Epiglot görülebilir, ancak glottik açıklık görülemez.
- **Evre IV:** Epiglot görülemez.




Zor Endotrakeal entübasyonda yaklaşımlar

- Orotrakeal entübasyon (klasik yol);
 - hızlı
- Nazotrakeal entübasyon
 - zaman alır, servikal hareket daha az, komplike
- Digital ETI
 - vokal kortların görülemediği aşırı sekresyon durumları
- Retrograd ETI
 - invaziv, zaman alır, deneyim
- Fiberoptik yardımcılarla ETI
- Cerrahi krikotirotomi

ZOR HAVA YOLU VE ALTERNATİF YÖNTEMLER

- Oral ve Nazal airway kullanmak
- Kılavuz (stylet) kullanmak
- Bronkoskop yardımcı entübasyon
- Laringeal maske
- Kombitüp (özofagotrakeal tüp)
- Retrograd entübasyon

TEMEL ALGORİTMA




Krikotirotomi

- **Endikasyonlar:**
 - Orotrakeal ya da nasotrakeal entübasyon yapılamaması
- **Kontrendikasyonlar:**
 - Kesin kontrendikasyonlar
 - Endotrakeal entübasyon sorunsuz yapılabilecekse
 - Trakeanın kesilmesi
 - Larinks kıkırdak fraktürleri
 - Rölatif kontrendikasyonlar
 - 5 yaşın altındaki çocuklar
 - Kanama diyatezi
 - Masif boyun ödemi
 - Akut larengeal hastalıklar

Malzemeler

- Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
- Spanç, betadin ve lokal anestetik
- 10 ya da 11 numara bistüri
- Trakea dilatatörü
- 6 mm lik Endotrakeal tüp
- Sabitleme için bant
- Balon maske, oksijen






- Dominant olmayan elin baş ve orta parmağı ile kıkırdaklar stabilize edilir




- İki kıkırdak arasında orta hatta, cilt ve cilt altını içeren vertikal insizyon yapılır.




- Krikotiroid membran horizontal olarak perfore edilir.




- İnsizyon genişetilir.




- İnsizyon biraz daha genişetilir.




- Trakeostomi tüpü yerleştirilir



- Trakestomi kanülü horiontal yönde sabitlemek için saatin tersi yönünde çevirilir.



- Trakeostomi kanülü şişirilir




Sabitleme işlemi yapılır.

Komplikasyonlar

- Tiroid İMA kanaması
- Trakea, Özefagus veya laringeal sinir laserasyonu
- Bakteriyal kondrit

İğne Krikotrotomi



- 12-16 G kateter 2.5 ml enjektöre bağlanır
- Krikoid kıkırdak ve krikotiroid membran palpe edilir
- Cilt-cilt altı 90° açıyla geçilir, enjektöre hava geldikten sonra 45° açıyla larinkse ilerlenir
- İğne ve enjektör geri çekilir
- 7mm endotrakeal tüp/adaptör enjektöre bağlanır

VAKA 2

- 30 yaşında erkek hasta
- Hastanın Klippel-Feil sendromu (Servikal vertebra hipoplazisi) tanısı mevcut.
- Hasta eklem ağrıları nedeni ile analjezi amaçlı acil servise başvuruyor.
- Hastaya IM NSAİİ ilaç yapılıyor.
- Daha sonra nefes darlığı, göğüs ağrısı ve bacaklarda döküntüsü başlıyor.
- Hastaya anafilaksi tedavisi başlanmak isterken hasta arrest oluyor.



Hava yolunu nasıl güvenlik altına alalım?


Videolaringoskop ile Entübasyon




Avantajlar

- **Daha az manüplasyon gerektirir.**
 - Nötral pozisyonda ya da servikal immobilizasyonla mümkündür
- **Daha iyi görüntü sağlar.**
 - Daha geniş görüş açısı
- **Daha az komplikasyona neden olur.**
 - Özofagus entübasyonu daha az, servikal hareketlenme daha az
- **Herkes görebilir.**
 - Eğitimde kullanılabilir.
- **Direkt laringoskop olarak kullanılabilir.**

- **Eğitim alıp pratik yapılması gerekir.**
 - Başarı tecrübe ile orantılıdır.
- **Kullandığınız cihazı tanıyın ve doğru bleydi seçin.**
 - Macintosh benzeri bleydi olan cihazlar
 - Zor havayolu için dizayn edilmiş ön açısı kavisli (Curve) bleydi olan cihazlar
 - Kanallı cihazlar (bu cihazlarda entübasyon tüpü önce kanala yerleştirilir)
- **Videolaringoskop bleydini doğru kullanın.**






Doğru Stileyi, doğru şekilde kullanın

- VL için üretilmiş olan rijid stile
- Klasik bir stilenin 'hokey sopası' şeklinde kullanımı
- Klasik bir stilenin bleyd açısına göre kıvrılarak hazırlanması ile




VL ile stile kullanımı


- Direkt laringoskopide sıklıkla entübasyon tüpü ortasından tutulur. Bu VL ile entübasyonda tüpe uygun pozisyon verilmesini zorlaştırır. **Tüp mümkün olduğunca proksimalden tutulmalıdır.** Bu şekilde distale yön vermeniz kolaylaşır.
- Tüpün ucu çok açılmış olduğundan vokal kord geçişi sonrası stileyi geri çekmezseniz stilenin çıkması zorlaşır. **Bunun için tüp vokal kordu geçtikten sonra stileyi hafifçe (3-5 sm) geri çekin.** Özellikle rijid stile veya Hokey Sopası şeklinde stile kullanıyorsanız bunu mutlaka yapmalısınız
- Tüpü yerleştirdikten sonra tüpü doğrudan çekerseniz yine zorluk yaşayabilirsiniz. **Stileyi dairesel bir hareket yaparak, zorlamadan çıkarın.**





Tüpü proksimalden tutun



Kord geçişi sonrası stileyi
hafifçe (3-5 cm) geri
çekin



Stileyi dairesel bir
hareketle çıkarın





Teşekkürler